



Scheda Fitosanitaria

Nome Comune: Cocciniglia nera della vite

Nome Scientifico: *Targionia vitis* (Sign.)

Ospite: *Vitaceae* (*Vitis vinifera* L.)

Categoria: Insetto

Classificazione:

Regno: *Animalia*

Divisione: *Arthropoda*

Classe: *Insecta*

Ordine: *Hemiptera-Homoptera*

Famiglia: *Diaspididae*

Specie: *Targionia vitis*

Criteri d'intervento: -Il controllo da parte di numerosi nemici naturali, tra i quali principalmente l'afelinide *Coccophagoides moeris* (Wlk.) e coleotteri predatori del genere *Cybocephalus* è in genere molto efficace;
-trattamenti giustificati solo nel caso di forti infestazioni utilizzando fosfororganici, oli minerali, polisolfuri di calcio o di bario o Buprofezin alla comparsa delle prime neanidi e limitando il trattamento al settore del vigneto infestato;
-la potatura e la spazzolatura delle parti attaccate sono in grado di contenere lo sviluppo di questa cocciniglia.

Note utili: -Infesta solitamente il ceppo o i cordoni permanenti e passa talora inosservata per il colore molto simile a quello delle parti legnose e per il fatto che si trova frequentemente localizzata sotto il ritidoma;
-alte temperature e bassa umidità ambientale causano elevata mortalità delle neanidi.

Bibliografia: -Guidotti A., Ricciolini M. (a cura di) (1999) La difesa integrata del vigneto in Toscana. ARSIA Toscana, EFFEEMME LITO, Firenze, 184 pp.
-Ponti I., Pollini A., Laffi F. (2003) Avversità e difesa vite. Ed. L'Informatore Agrario, 178pp.
-Tremblay E. (1998) Entomologia applicata. Vol. II/1. Liguori Editore, Napoli: 329 pp.

Fattori predisponenti:

Fattori Predisponenti

527	Reiterati interventi con fitofarmaci a largo spettro d'azione	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)
642	Potature irregolari o insufficienti	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)

Sintomatologia:

Germoglio

521	Deperimenti	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)
-----	-------------	--------------------------------------

Tralcio


607	Presenza di esemplari	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
640	Rigonfiamenti	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Media)
641	Deperimenti	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)



Codici dei sintomi collegati: 607

Note:

Femmine svernanti di Targionia vitis sotto il ritidoma del ceppo



Codici dei sintomi collegati: 607

Note:

Femmina matura di Targionia vitis a cui è stato rimosso lo scudetto