

Scheda Fitosanitaria

Nome Comune: Cocciniglie farinose della vite

Nome Scientifico: *Planococcus ficus, Planococcus citri*

Ospite: Vitaceae (*Vitis vinifera L.*)

Categoria: Non definita

Classificazione:

Regno: Animalia

Divisione: Arthropoda

Classe: Insecta

Ordine: Rhynchota

Famiglia: Pseudococcidae

Specie: *Planococcus ficus, Planococcus citri*

Criteri d'intervento:

- Buon controllo naturale assicurato da vari coleotteri predatori e imenotteri parassitoidi;
- trattamenti estivi con fosforganici contro tignole della vite e cicaline controllano anche questa cocciniglia;
- solo in caso di forti e ripetuti attacchi i potranno eseguire interventi specifici localizzati, mirati contro le neanidi della prima generazione, con oli minerali, polisolfuri di calcio o di bario, Buprofezin.

Note utili:

Bibliografia:

- Guidotti A., Ricciolini M. (a cura di) (1999) La difesa integrata del vigneto in Toscana. ARSIA Toscana, EFFEEMME LITO, Firenze, 184 pp.
- Pollini A. (1998) Manuale di Entomologia applicata. Edagricole, 1462pp.
- Ponti I., Pollini A., Laffi F. (2003) Avversità e difesa vite. Ed. L'Informatore Agrario, 178pp.

Fattori predisponenti:

Fattori Predisponenti

526	Eccessi di concimazione e tutte le altre cause che portano ad abbondante sviluppo della vegetazione	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
399	Vegetazione folta	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
527	Reiterati interventi con fitofarmaci a largo spettro d'azione	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)

Sintomatologia:

Foglia

528	Presenza di esemplari sulla pagina inferiore delle foglie	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
529	Presenza di melata e fumaggine sulla vegetazione	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
232	ingiallimento	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa)
186	Filloptosi.	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa)

Frutti

531	Presenza di esemplari sul rachide e tra gli acini	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
532	Presenza di melata e fumaggine sugli acini	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa)
533	Ritardo nella maturazione	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)

Germoglio

530	Presenza di esemplari	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
521	Deperimenti	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)

Tronco

534	Presenza di esemplari sotto il ritidoma	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
-----	---	-------------------------------------



Codici dei sintomi collegati:

531

Note:

Esemplari di Planococcus ficus su acino della varietà Red globe




Codici dei sintomi collegati:

531 532

Note:

Grappolo infestato da Cocciniglie farinose con presenza di melata e fumaggine



Codici dei sintomi collegati:

534

Note:

Esemplari di Cocciniglie farinose su ceppo di vite sotto il ritidoma