



## Scheda Fitosanitaria

**Nome Comune:** Degenerazione infettiva - Scolorazione perinervale

**Nome Scientifico:** *Non definito*

**Ospite:** *Vitaceae (Vitis vinifera L.)*

**Categoria:** Virus

**Classificazione:**

**Regno:** *non definito*

**Divisione:** *non definito*

**Classe:** *non definito*

**Ordine:** *Nepovirus*

**Famiglia:** *Comoviridae*

**Specie:** *Grapevine fanleaf virus (GFLV) ceppo cromogeno*

**Criteri d'intervento:** -Utilizzo di portinnesti e marze esenti dal virus  
-All'impianto del vigneto assicurarsi, mediante analisi nematologica del terreno, dell'assenza di nematodi vettori

**Note utili:** -Malattia non molto diffusa.  
-Si propaga per innesto di materiale infetto; con i portinnesti infetti o attraverso nematodi vettori: *Xiphinema index* e *X. italiae*. La diagnosi può effettuarsi: con metodi immunologici, utilizzando gli antisieri, o con metodo biologico mediante innesti su piante indicatrici del genere *Vitis*

**Bibliografia:** -Bovey R., Gärtel W., Hewitt W.B., Martelli G.P., A. Vuittenez (1980) Virus and virus-like diseases of grapevines. Payot Lausanne – La Maison Rustique Paris – Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Ed., pp.181.  
-Granata G., Eggon E. (1992) Malattie della vite – Guida alla diagnosi. Galatea editrice, Acireale (CT), 271 pp.  
-Martelli G.P., Boudon Padiou E. (Eds) (2006) Directory of Infectious Diseases of Grapevines and Viroses and Virus-like Diseases of the Grapevine. In: Options Méditerranéennes Serie B: Studies and Research, Number 55. Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM), Bari, pp. 279.

---

### Sintomatologia:

*Foglia*

562 Aree clorotiche perinervali

(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)



**Codici dei sintomi collegati:** 562

**Note:**

Aree clorotiche perinervali di colore giallo cromo su foglia di vite affetta da Scolorazione perinervale



**Codici dei sintomi collegati:** 562

**Note:**

Aree clorotiche perinervali di colore giallo cromo su foglia di vite affetta da Scolorazione perinervale