

Scheda Fitosanitaria

Nome Comune:	Oidio
Nome Scientifico:	<i>Uncinula necatrix, Oidium tuckeri</i>
Ospite:	Vitaceae (<i>Vitis vinifera L.</i>)
Categoria:	Fungo
Classificazione:	Regno: <i>Fungi</i> Divisione: <i>Ascomycota</i> Classe: <i>Ascomycetes</i> Ordine: <i>Erysiphales</i> Famiglia: <i>Erysiphaceae</i> Specie: <i>Uncinula necatrix</i>
Criteri d'intervento:	<ul style="list-style-type: none"> -Terapia preventiva con zolfi fino all'allegagione. -Dall'allegagione all'invaiatura con prodotti endoterapici. -Dopo l'invaiatura, per le uve da tavola, prodotti endoterapici misti a zolfo.
Note utili:	<ul style="list-style-type: none"> -Fungo xerofitico per la capacità di germinare a bassi livelli di umidità -Attacca tutti gli organi verdi e le bacche anche dopo l'invaiatura
Bibliografia:	<ul style="list-style-type: none"> -Granata G., Eggon E. (1992) Malattie della vite – Guida alla diagnosi. Galatea editrice, Acireale (CT), 271 pp. -Ponti I., Pollini A., Laffi F. (1991) Avversità e difesa vite. Ed. L'Informatore Agrario, 158pp.

Fattori predisponenti:

Fattori Predisponenti

493	Caratteristiche genetiche dei vitigni europei	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
282	Forme di allevamento	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
494	Svernamento del fungo nei tralci o nelle perule delle gemme	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)

Sintomatologia:

Foglia

476	Margini increspati	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
477	lucentezza oleosa	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
478	Muffa bianca sulla pagina superiore	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
185	Clorosi della lamina fogliare	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Media)
479	Malformazione della lamina fogliare	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)
480	Aree decolorate con imbrunimenti	(Frequenza: Media; Rilevanza: Alta)
481	Macchie brunastre reticolate sul picciolo	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)

Frutti

485	Acini con leggera muffetta biancastra	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
486	Spaccatura acini	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
487	Suberosità sugli acini adulti	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
488	Reticolatura sugli acini adulti	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)
489	Suberificazione cellule epidermiche dell'acino	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
490	Rachide con reticolatura bruna	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

Germoglio

483	Muffa bianca	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
484	Malformazioni	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

Infiorescenza

482	Ragnatela feltrosa	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
-----	--------------------	------------------------------------

Tralcio

491	Muffa bianca sui tralci verdi	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
492	Macchie detritiche reticolate tra gli internodi	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)



Codici dei sintomi collegati: 477

Note:

Foglie giovani di vite affette da oidio con macchie lucide e distorsioni del lembo



Codici dei sintomi collegati: 478

Note:

Macchie biancastre sul lembo fogliare costituite dal micelio, conidiofori e conidi del fungo



Codici dei sintomi collegati: 481

Note:

Picciolo con macchie necrotiche di aspetto reticolato



Codici dei sintomi collegati: 492

Note:

Tralcio con macchie scure e detritiche



Codici dei sintomi collegati:

485

Note:

Muffa biancastra, pruinosa su rachide, pedicelli e bacche nella fase fenologica di mignolatura



Codici dei sintomi collegati:

486

Note:

Acini con micelio del fungo e spaccature