

Scheda Fitosanitaria

Nome Comune: Tripide della vite

Nome Scientifico: *Drepanothrips reuteri* Uzel

Ospite: Vitaceae (*Vitis vinifera L.*)

Categoria: Insetto

Classificazione:

Regno: *Animalia*

Divisione: *Arthropoda*

Classe: *Insecta*

Ordine: *Thysanoptera*

Famiglia: *Thripidae*

Specie: *Drepanothrips reuteri*

Criteri d'intervento: - Lotta giustificabile solo durante le prime fasi vegetative e sui vitigni più sensibili.

- Allo stadio di foglie distese, con 2-3 tripidi-foglia si può intervenire con acefate, acrinatrina, dimetoato

Note utili: - risulta dannoso soprattutto all'inizio della primavera

- Il vitigno Malvasia appare particolarmente sensibile

Bibliografia: - Pollini A., Ponti I., Laffi F. (1993) Insetti dannosi alle piante da frutto. Ed. L'Informatore Agrario: 302pp.

- Guidotti A., Ricciolini M. (a cura di) (1999) La difesa integrata del vigneto in Toscana. ARSIA Toscana,

EFFEEMME LITO, Firenze, 184 pp.

Fattori predisponenti:*Fattori Predisponenti*

401	Eccessive concimazioni azotate	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Bassa)
-----	--------------------------------	-------------------------------------

Sintomatologia:*Foglia*

409	Piccole macchie necrotiche circondate da tessuti clorotici	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
410	tacche necrotiche lungo le nervature	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)

Frutti

417	Croste suberificate	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)
416	Colatura	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)

Germoglio

413	Ritardi nel germogliamento	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
414	Lesioni necrotiche reticolate e striate alla base dei germogli	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)

Infiorescenza

411	aborto fiorale	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
-----	----------------	--------------------------------------

Tralcio

418	Accorciamento internodi	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
419	Ritardo nell'accrescimento	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)



Codici dei sintomi collegati:

414

Note:

Lesioni necrotiche lungo l'asse del germoglio causate dalle punture di ovideposizione e nutrizione del Tripide della Vite



Codici dei sintomi collegati:

417

Note:

Tacche suberificate sugli acini causate dalle punture di alimentazione del Tripide della Vite e formatesi in seguito a necrosi delle cellule epidermiche lesionate dall'insetto



Codici dei sintomi collegati:

418 419

Note:

Accorciamento degli internodi dei tralci in accrescimento con alterazione del portamento